



Рис. 37, Карта морей Дальнего Востока.

Самые яркие гавириды — моржевые, сомалийские и тюлениные — встречаются в северо-западной части Охотского моря, а также в северо-восточной части Японского моря. В северо-западной части Охотского моря, в районе острова Сахалин, обитают гавириды: моржевая гавирида, сомалийская гавирида, сивуч и ларга. В северо-восточной части Охотского моря, в районе острова Сахалин, обитают гавириды: моржевая гавирида, сомалийская гавирида, сивуч и ларга. В северо-западной части Охотского моря, в районе острова Сахалин, обитают гавириды: моржевая гавирида, сомалийская гавирида, сивуч и ларга. В северо-западной части Охотского моря, в районе острова Сахалин, обитают гавириды: моржевая гавирида, сомалийская гавирида, сивуч и ларга.

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАСТОНОГИХ В МОРЯХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

В настоящее время следует считать установленным, что следующие виды пологряда lastonogих — *Pinnipedia* населяют моря Дальнего Востока.

*Phoca hispida* Schr. — акиба, с двумя подвидами: *Ph. hispida ochotensis* и *Ph. hispida krascheninikovi*;

*Phoca vitulina largha* Pall. — ларга;

*Histriophoca fasciata* Zimm. — полосатый тюлень, крылатка;

*Ereignathus barbatus nauticus* Pall. — лахтак;

семейство *Otaridae* сивучеобразные:

*Eumetopias jubatus* Schr. — сивуч;

*Callopinus ursinus* L. — котик командорский;

» *curilensis* yord. and Cl. котик — курильский;

*Odobenoides rosmarus divergens* Iel. — морж беринговский.

Общих для всего Дальнего Востока русских названий отдельных видов lastonogих нет, и в разных, часто смежных районах местное население называет их по-разному.

*Phoca hispida* носит название «акиба» в северо-западной, северной и северо-восточной части Охотского моря (Охотский, Ольско-Тауйский, Ямский и Пенжино-Гижигинский районы); по западному и восточному побережью Камчатки ее называют акиба и «школьник», на побережье Сахалина русские называют ее гиляцким словом «маченга», в юго-западной части Охотского моря употребляются названия «долгайка» и «кумычанка» (от тунгусских названий «толкай» и «кумычан»), на Чукотском полуострове русские называют «серую нерпою», чукчи и эскимосы — «мелель».

*Phoca vitulina largha* называют ларгой по всему побережью Охотского моря, от Татарского пролива до Пенжинской губы. По западному берегу Камчатки, начиная от Тигильского района, ее называют нерпою, по восточному берегу Камчатки — и нерпою (чаще), и ларгою. На Сахалине она носит название нерпы. На Чукотке русские называют ее «пестрою нерпою».

*Ereignathus barbatus* носит название лахтака у русского и камчадалского населения всей Камчатки, Чукотки и отчасти Сахалина. По юго-западному побережью (Удско-Кольский район), а также на Сахалине его называют «сивучем» (настоящего сивуча там почти не знают). По всему же северо-западному и западному побережью Охотского (от Охотского района и до

Пенжинского) и русское и камчадалское население называет его только «нерпой»<sup>1</sup>.

Лишь котик, морж и сивуч имеют русские названия, общие для всех районов.

Следует иметь в виду, что эта путаная синонимика отразилась и в статистических данных по добыче и скупке продукции морского зверя у местного населения. Поскольку нет общепринятой терминологии в названиях тюленей, обычно в районах при учете добычи или в отчетности по скупке приводятся местные названия. Поэтому при обработке статистических порайонных данных необходимо учитывать это обстоятельство, поэтому же мы сочли необходимым привести здесь подробно всю синонимику. В дальнейшем же изложении мы принимаем названия — акиба, ларга, лахтак и крылатка или полосатый тюлень.

Населяют перечисленные виды ластоногих, за исключением котика и моржа, которых мы в данной работе не касаемся в дальнейшем совсем, все моря Дальнего Востока. Однако их численное соотношение и распределение далеко не равномерное, если мы будем рассматривать их по отдельным районам.

Если мы возьмем первые из двух видов — акибу и ларгу, то изучение их распределения показывает, что в целом акиба количественно преобладает над ларгой. Однако по мере продвижения на юг акиба все более и более замещается ларгой, так что в южных районах последняя становится численно значительно преобладающей над первой видом. Так, в северной части Берингова моря в районе Чукотского полуострова в добыче местного населения, несомненно отражающего действительные численные соотношения видов, акиба составляет около 90%, остальные 10 падают главным образом на лахтака и незначительный процент на ларгу. В Охотском море акиба также преобладает в северных районах — Пенжинском, Гижигинском, Тауйском заливах — и убывает, вообще говоря, при продвижении на юг. Наконец, в южных водах Дальнего Востока (Татарский пролив — район Сахалина) ларга значительно подавляет все остальные виды, составляя до 80% добычи всех тюленей, а акиба — менее 1%.

Эту закономерность в распределении указанных двух видов — убывание ларги в северных широтах и убывание акибы в южных — объясняет в значительной мере учет при рассмотрении распределения факторов питания и гидрометеорологических. Ларгу можно считать спутником районов лососевых рыб. Это особенно заметно на Чукотке, где она встречается именно в районах гольцовских речек; при этом характерно, что ее очень мало на севере побережья Чукотки — в районе Берингова пролива и несколько больше на юге — заливах Пинкегней, Ткаин, Прорыбления, где как раз больше лососевых. Далее, в Анадырском заливе, куда уже входит для икрометания кета, мы видим значительное увеличение численности ларги, которая добывается здесь уже в количестве до 15% от добычи акибы.

В Охотском море районами значительного численного преобладания ларги являются все западное побережье Камчатки, районы рек Ямы, Тауя, Охоты, — т. е. наиболее богатые лососевыми места; к ним надо также отнести Татарский пролив, где ларга, как указывалось, является преобладающим видом. Таким образом, во всяком случае, в летнее и осеннеое время районы массовых ходов лососевых являются и основными районами распределения в это время ларги.

Другим фактором, с которым связано количественное соотношение в рас-

<sup>1</sup> Интересно отметить, что слово лахтак здесь также употребляется, но его относят не к зверю, а к шкуре, разделанной особым способом, — именно всякая шкура морского зверя, разрезанная при снятии надвое по спине, называется лахтаком.

пределении акибы и ларги, является длительность существования ледового покрова моря. Именно там, где имеет место наиболее позднее существование льда, наблюдается преобладание акибы, и наоборот, в районах, ранее освобождающихся от него, преобладает ларга. В настоящее время мы затрудняемся решить, является ли ледовитость фактором, непосредственно действующим на указанное распределение, или лишь косвенно, сопутствуя или обусловливая богатство района лососевыми. Наиболее ярким примером такой связи между ледовитостью и распределением ластоногих является сопоставление Шантарского моря, где ледовый покров держится до июля, а иногда и до августа, и где мы имеем значительное преобладание акибы, с западным побережьем Камчатки, где район реки Тигиль, лежащий в более северных широтах, но освобождающийся совершенно от льда в начале мая, исключительно богат ларгою и беден акибой.

Лахтак, занимающий третье по численности место, если взять запасы дальневосточных ластоногих в целом, также населяет все моря Дальнего Востока. Распределение его более равномерное, чем акибы и ларги. Повидимому, он является наиболее оседлым видом, придерживаясь круглый год в общем одних и тех же районов своего обитания, обусловленных в значительной степени положением полей питания.

Однако наблюдается в этом отношении зависимость и от характера берега, именно лахтак наиболее многочисленен в районах глубоко расчлененного берега, имеющего обширные заливы с мелководными вершинами, заиленными впадающими в них реками. В глубоких узких заливах типа фиордов ледникового происхождения он встречается редко. Наиболее богатыми лахтаком районами являются Шантарское море с его заливами, Тауйский залив, Пенжинский залив с губами Пенжинской и Гижигинской, северная часть Берингова моря, прилегающая к Чукотскому полуострову. Бедно им западное побережье Камчатки, а также восточное, за исключением пролива Литке (Кагаринский район), где он несколько увеличивается в количестве; немногочисленен лахтак в Анадырском заливе.

Распространение полосатого тюленя или крылатки остается еще мало известным. Данные экспедиций говорят лишь о его широком распространении от южной оконечности Сахалина и до Берингова пролива на Чукотке. Он констатирован на весенних льдах в Татарском проливе, в районе Шантарского моря, в Пенжинском и в Тауйском заливах, в Беринговом море, в проливе Литке, в заливе Корфа, в Анадырском районе и по всему побережью Чукот-





Рис. 38. Остров Ионы

ского полуострова. Везде констатации встреч его относятся к ледовому периоду; лишь материалы по заливу Корфа (Берингово море) указывают, что он по-падается позднею осенью, не в ледовый период в сети, выставленные коряками на морского зверя у м. Говзна. В перечисленных районах он не редок, как указывается в литературе по систематике ластоногих, но обычен и постоянен, однако всегда в небольших количествах и разбросанно. В промысле он обыкновенно насчитывается в этих районах в немногих десятках за год.

Распространение сивуча строго локализовано и приурочено к немногим скалистым островам и таким же мысам в необитаемых человеком районах.

В Охотском море он наиболее многочислен на острове Ионы и группе Ямских островов. Далее экспедиция установила его нахождение на острове Ольском (Завьялова), где находится довольно большое лежбище на SO-й его стороне, приблизительно в районе пересечения береговой линии 59-й параллелью. По опросным данным его лежбища имеются в Тауйском районе у м. Дугинского и далее на восток у м. Евреинова на полуострове Кони. По западному берегу Камчатки экспедицией констатировано лежбище на кекурах (камнях) в Тигильском районе у мыса Зубчатого—среднего мыса Утхолокского берегового массива. Лежбище распадается на четыре группы и насчитывает до 50 голов; временно залегает сивуч взною в небольшом количестве и на Птичьем острове.

Рис. 39. Остров Ионы.



В Беринговом море, кроме отмеченных уже в литературе мест залегания сивуча на Командорских островах, лежбища его установлены на юго-восточной стороне острова Верхотурова (около 50 шт.) и небольшое лежбище (около 15 шт.) на острове Карагинском у мыса Крашенинникова.

По восточному берегу Камчатки лежбища сивуча находятся у мысов Козловского и Шипунского, у мыса Начикинского (Карагинский район) и, по данным И. А. Ландина, в бухте Дежнева (между мысами Наварин и Олюторским), одиночные экземпляры постоянно заходят и севернее; так, в 1930 и 1931 гг. были убиты сивучи в районе залива Креста и у мыса Беринга. На Чукотке в селе Яндогай я видел в яранге чукчи череп сивуча, убитого у мыса Яндогай в 1929 г.

Все сказанное относится к летнему распределению сивуча, и на указанные лежбища он приходит, как только исчезает береговой ледовый припай, держась до поздней осени — момента обмерзания прибрежных камней.

Районы его зимнего пребывания освещены недостаточно.